

ANDROGA / BRASSE / SILVER BREAM

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – julij / Mai – Julij / May - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	17.000 - 110.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3
Velikost	Größe	Size:	20 - 30 cm, max. 35 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

BELI AMUR / GRASKARPFEN / GRASS CARP

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	v naravnem arealu april - junij pri 15-17°C / April – Juni bei 15 – 17°C
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	30.000 - 20.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	Max 150 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	tujerodna / allochthon / Alien
Selitev	Migration	Migration mode:	selitve v naravnem naselitvenem območju / Migrationen innerhalb des Lebensraumes / In nativ area potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

BELICA / MODERLIESCHEN / SUN BLEAK

Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – maj / April – Mai / April - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	740 - 2300
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	5 - 7 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	Ex? – domnevno izumrla / möglicherweise ausgestorben / Possibly extinct
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Ladislav Pekarik FB)

BELOPLAVUTI GLOBOČEK / WEISSFLOSSENGRÜNDLING / DANUBE WHITEFIN GUDGEON ◀◀◀◀◀◀◀◀

Romanogobio vladykovi (Fang 1943)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – julij / Mai – Juli / May - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	5000 - 6000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3
Velikost	Größe	Size:	10 - 12 cm, max. 13 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	V - ranljiv / verletzlich / Vulnerable
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

BLISTAVEC / STRÖMER / STRIPED CHUB, RIFFLE DACE

Telestes souffia (Risso, 1827)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – maj / März – Mai / March - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	5500 - 8000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3
Velikost	Größe	Size:	12 - 18 cm, max. 25 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)

BOLEN / RAPFEN / ASP


Aspius aspius (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken/ Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – junij /April – Juni / April - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	80.000 – 100.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3-5
Velikost	Größe	Size:	50 - 75 cm, max. 120 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet /Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: <http://wikimedia.org>)

Zingel zingel (Linnaeus, 1766)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donabecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – maj / März – Mai / March - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	5000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3
Velikost	Größe	Size:	15 - 25 cm, max. 50 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet /Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

ČINKLJA / SCHLAMMPEITZGER / WEATHER LOACH, WEATERFISH

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – junij / April - Juni / April - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	10.000 – 150.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	20 - 25 cm, max. 40 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet /Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: dr. Metka Povž)

ČRNI SOMIČ / SCHWARZER ZWERGWEIS / BLACK BULLHEAD

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – julij / Mai – Juli / May - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	15.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3
Velikost	Größe	Size:	15 - 30 cm, max. 61 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	tujerodna / allochthon / Alien
Status vrste	Herkunft	Species status:	-
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: dr. Metka Povž)

ČRNOMORSKA ČEPA / DONAUHERING / BLACK SEA SHAD

Alosa immaculata (Bennett, 1835)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – avgust / April - August
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	80.000 – 200.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3
Velikost	Größe	Size:	35 - 40 cm; max 60 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	R - redka / selten/ Rare
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	seli se v reke na drst / wandert in die Flüsse zum Laichen / Anadromou

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: <http://wikimedia.org>)

DONAVSKI PIŠKUR / DONAUBACHNEUNAUGE / DANUBE BROOK LAMPREY

Eudontomyzon vladykovi (Oliva et Zanandrea, 1959)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – maj / April – Mai / April - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	20.000 – 38.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	4 - 6
Velikost	Größe	Size:	22 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet /Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

GLOBOČEK / KESSLEGRÜNDLING / DANUBE GUDGEON

Gobio obtusirostris (Valenciennes, 1842)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	April - August
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	1000 - 3000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3
Velikost	Größe	Size:	10 - 15 cm, max. 20 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: dr. Metka Povž)

GRBASTI OKUN / DONAUKAULBARSCH / DANUBE RUFFE

Gymnocephalus baloni (Holčík & Hensel, 1974)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – maj / April – Mai / April - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	do / bis zu / up to 10.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	9,5 cm, max. 12 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet /Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

JEGULJA / AAL / EUROPEAN EEL

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – julij / März – Juli / March - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	ni znano / unbekannt / unknown
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	8 - 10
Velikost	Größe	Size:	40 – 90 cm, max. 200 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	Ex? – izumrla / ausgestorben / Extinct
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	seli se v morje na drst / laicht im Meer ab/ Catadromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Janez Gregori)



JELŠEVEC / EDELKREBS / NOBLE CRAYFISH

Astacus astacus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	december – januar / Dezember - Jänner / December - January
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	200 – 400 jajčec / Eier / Eggs
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3.- 5 .leto / Jahr / year
Velikost	Größe	Size:	do / bis zu / up to 25 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	V - ranljiv / verletzlich / Vulnerable
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	se ne seli / keine Migrationen

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)




Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – maj / März - Mai / March - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	70.000 – 120.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 5
Velikost	Größe	Size:	35 - 40 cm / max. 85 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	dolge selitve / lange Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: <http://www.fishbase.org/>)

KAPELJ, GLAVAČ / KOPPE / BULLHEAD, SCULPIN

Cottus gobio (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	februar – maj / Februar – Mai / February – May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	100 - 300
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	8 - 10 cm, max. 18 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	V - ranljiv / verletzlich / Vulnerable
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)

Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – junij / April – Juni / April - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	10.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	4 - 9 samice / Weibchen / Female 3 – 5 samci / Männchen / Male
Velikost	Größe	Size:	35 - 60 cm, max. 125 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	R - redka / selten / Rare
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	dolga drstna migracija / lange ablaich Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: <http://wikimedia.org>)

KLEN / AITEL / CHUB

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – junij / April – Juni / April - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	100.000 – 200.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 4 samci / Männchen / Male4 - 6 samice / Weibchen / Female
Velikost	Größe	Size:	20 - 40 cm, max. 60 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

KLENIČ / HASEL / COMMON DACE

Leuciscus leuciscus (Linneaus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – april / März – April / March - April
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	90.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3
Velikost	Größe	Size:	15 - 20 cm, max. 37 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)

Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – maj / April – Mai / April - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	76.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 4
Velikost	Größe	Size:	20 - 30 cm, max. 45 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	R - redka / selten / Rare
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	dolge selitve / lange Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: <http://wikimedia.org>)

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – junij / Mai – Juni / May - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	300.000 – 750.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 6
Velikost	Größe	Size:	25 - 75 cm, max. 120 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen divji krap/ Wildform gefährdet / Endangered wild form
Status vrste	Herkunft	Species status:	domoroden donavsko, naseljen jadransko / autochthon im Donaubecken, angesiedelt im Adriabecken / Native - Danube basin, translocated - Adriatic babasni
Selitev	Migration	Migration mode:	dolge selitve / lange Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

KRAP (gojeni) / KARPFEN / CARP

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – junij / Mai – Juni / May - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	300.000 – 750.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 6
Velikost	Größe	Size:	25 - 75 cm, max. 120 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen divji krap/ Wildform gefährdet / Endangered wild form
Status vrste	Herkunft	Species status:	domoroden donavsko, naseljen jadransko / autochthon im Donaubecken, angesiedelt im Adriabecken / Native - Danube basin, translocated - Adriatic babasni
Selitev	Migration	Migration mode:	dolge selitve / lange Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

LINJ / SCHLEIE / TENCH

Tinca tinca (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube	
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – julij / Mai – Juli / May - July	
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	300.000 – 800.000	
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 6 samci / Männchen / Male	3 - 7 samice / Weibchen / Female
Velikost	Größe	Size:	20 - 40 cm, max. 65 m	
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered	
Status vrste	Herkunft	Species status:	domoroden donavsko, naseljen jadransko / autochthon im Donaubecken, angesiedelt im Adriabecken / Native - Danube basin, translocated - Adriatic babasni	
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous	
(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)				

LIPAN / ÄSCHE / EUROPEAN GRAYLING

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)




Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – april / März - April / March - April
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	700 – 36.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 4
Velikost	Größe	Size:	25 - 35 cm / max. 63 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	V - ranljiv / verletzlich / Vulnerable
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)

MENEK / AALRUTTE / BURBOT

Lota lota (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	november – marec / November – März / November - March
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	33.000 – 3.000.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 4
Velikost	Größe	Size:	30 - 60 cm, max. 152 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

MRENA / BARBEL / COMMON BARBEL

Barbus barbus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – junij / Mai – Juni / May - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	15.000 – 32.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 5 samci / Männchen / Male 4 - 5 samice / Weibchen / Female
Velikost	Größe	Size:	25 - 50 cm, max. 90 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

NAVADNI KORESELJ / KARAUSCHE / CRUCIAN CARP

Carassius carassius (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – julij / Mai – Juli / May - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	100.000 – 300.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 4
Velikost	Größe	Size:	20-35 cm, max. 55 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domoroden donavsko, naseljen jadransko / autochthon im Donaubecken, angesiedelt im Adriabecken / Native - Danube basin, translocated - Adriatic babasni
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)



NAVADNI KOŠČAK / STEINKREBS / STONE CRAYFISH

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	jesen / Herbst / autumn
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	ni znano / unbekannt / unknown
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 – 5 leto / Jahr / year
Velikost	Größe	Size:	11 – 15 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	Se ne seli / keine Migrationen

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: <http://wikimedia.org>)

NAVADNI OKUN / KAULBARSCH / RUFFE

Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – maj / März – Mai / March - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	4000 – 15.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3
Velikost	Größe	Size:	15 - 25 cm, max. 29 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

Perca fluviatilis (Linnaeus, 1766)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – maj / März – Mai / March - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	4000 – 200.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	15 - 30 cm, max. 50 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

OGRICA / RUSSNASE / VIMBA

Vimba vimba (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – julij / März – Juli / March - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	27.000 – 115.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 samci / Männchen / Male 4 samice / Weibchen / Female
Velikost	Größe	Size:	20 - 30 cm, max. 50 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	dolge selitve / lange Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: <http://wikimedia.org>)

sinonim: *Gobio kesslerii*, Dybowski 1862



(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

PEZDIRK / BITTERLING / BITTERLING

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

sinonim: Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – junij / Mai – Juni / May - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	100 - 400
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	4 - 6 cm , max. 9 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

PISANEC / ELRITZE / MINNOW

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – junij / April – Juni / April - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	200 - 1000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	7 - 10 cm, max. 13 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)

PISANKA / SCHNEIDER / SPIRLIN

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – junij / Mai – Juni / May - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	3000 - 6000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3
Velikost	Größe	Size:	11 - 13 cm, max. 16 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous
(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)			

Rutilus virgo (Heckel, 1852)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – maj / März – Mai / March - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	35.000 – 60.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 4 samci / Männchen / Male 4 - 5 samice / Weibchen / Female
Velikost	Größe	Size:	20 - 35 cm, max. 50 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	srednje dolge selitve/ mittellange Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)

PLOŠČIČ / BRACHSE / COMMON BREAM

Abramis brama (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – junij / Mai – Juni / May - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	90.000 – 600.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 4
Velikost	Größe	Size:	35 - 45 cm, max. 70 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous
(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)			

PODUST / NASE / NASE CARP, NASE

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)




Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – junij / März – Juni / March - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	15.000 – 25.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 5
Velikost	Größe	Size:	25 - 40 cm, max. 63 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožena v donavskem povodju / gefährdet im Donaubecken / Endangered in the Danube basin
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna donavsko, naseljena jadransko / autochthon im Donaubecken, angesiedelt im Adriabecken / Native - Danube, translocated - Adriatic
Selitev	Migration	Migration mode:	dolge selitve / lange Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

Micropterus salmoides (La Cepède, 1802)

Micropterus salmoides (La Cepède, 1802)



(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)

POTOČNA MRENA, POHRA / SEMLING / BALCAN BARBEL

Barbus balcanicus (Kotlik, Tsigenopoulos, Rab et Berrebi, 2002)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – julij / Mai – Juli / May - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	7000 - 11 000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3 samci / Männchen / Male 3 - 4 samice / Weibchen / Female
Velikost	Größe	Size:	15 - 20 cm, max. 30 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous
Varstveni ukrepi	Schutzmaßnahmen in Slowenien	Conservation status in Slovenia:	zakonsko varstvo / gesetzlich geschützt (Schonzeit, Größe) / Protected by closed season, daily bag and max. length

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

POTOČNA POSTRV / BACHFORELLE / BROWN TROUT

Salmo trutta m. fario (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	oktober – februar / Oktober – Februar / October - February
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	100 - 3000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3
Velikost	Größe	Size:	25 - 30 cm, max. 100 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna donavsko, naseljena jadransko / autochthon im Donaubecken, angesiedelt im Adriabecken / Native - Danube, translocated - Adriatic
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)



POTOČNA ZLATOVČICA /
BACHSAIBLING / BROOK
TROUT

Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	oktober – november / Oktober – Novemver / October - November
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	1000 - 5000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 samci / Männchen / Male 3 samice / Weibchen / Female
Velikost	Größe	Size:	20 - 35 cm, max. 86 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	tujerodna / allochthon / Alien
Status vrste	Herkunft	Species status:	-
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)

PSEUDORAZBORA / BLAUBANDBÄRBLING / TOPMOUTH GUDGEON, PSEUDORASBORA

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donabecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – junij / März - Juni / March - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	3000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	1
Velikost	Größe	Size:	9 - 10 cm, max. 11 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	tujerodna / allochthon / Alien
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

RDEČEOKA, ČRNOVKA / ROTAUGE / ROACH

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – junij / April - Juni /April - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	50.000 – 100.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3 samci / Männchen / Male - 4 samice / Weibchen / Female
Velikost	Größe	Size:	20 - 35 cm, max. 50 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

RDEČEPERKA / ROTFEDER / COMMON RUDD

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – junij / April - Juni / April - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	90.000 – 200.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 4
Velikost	Größe	Size:	25 cm, max. 45 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

REČNA BABICA / BACHSCHMERLE / STONE LOACH

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – junij / April - Juni / April - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	6000 – 10.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	8 - 12 cm, max. 16 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	V - ranljiv / verletzlich / Vulnerable
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)



**RJAVI SOMIČ / ZWERGWELS /
BROWN BULLHEAD**

Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819)
sinonim: Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – maj / Mai / May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	6000 – 13.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3
Velikost	Größe	Size:	20 - 30 cm, max. 55 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	tujerodna / allochthon / Alien
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – julij / Mai - Juli / May - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	25.000 – 30.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 5
Velikost	Größe	Size:	20-30 cm, max. 60 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	R - redka / selten / Rare
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	dolge selitve / lange Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)



SIGNALNI RAK / SIGNALKREBS / SIGNAL CRAYFISH

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	december – januar (samice z jajci od februarja do junija) / Dezember – Jänner (Weibchen tragen die Eier von Februar bis Juni) / December – January
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	200 - 400 jajčec / Eier / Eggs
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	15 -17 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	tujerodna / allochthon / Alien
Selitev	Migration	Migration mode:	se ne seli / keine Migrationen

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

SIVI ALI PISANI TOLSTOBIK / MARMORKARPFEN / BIGHEAD CARP

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	junij – julij / Juni - Juli / June - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	35.000 – 50.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	4
Velikost	Größe	Size:	Max. 200 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	tujerodna / allochthon / Alien
Selitev	Migration	Migration mode:	dolge selitve v naravnem naselitvenem območju / lange Migrationen im natürlichem Lebensraum / In nativ area potamodromous

SMRKEŽ / SCHRÄTZER / YELLOW POPE

Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)




Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – maj / April – Mai / April - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	10.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	15 - 20 cm, max. 35 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Janez Gregori)

SMUČ / ZANDER / PIKE PERCH

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)

Sinonim: Stizostedion lucioperca



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – maj / April – Mai / April - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	150.000 – 200.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 5
Velikost	Größe	Size:	40 - 70 cm, max. 120 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

Silurus glanis (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – junij / Juni / June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	30.000/ na kg telesne teže / pro kg Körpergewicht / per kg of body weight
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 4
Velikost	Größe	Size:	1 - 2 m, max. 5 m
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	V - ranljiv / verletzlich / Vulnerable
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna - donavsko, naseljena - jadransko / autochthon im Donaubecken – angesiedelt im Adriabecken / Native - Danube, translocated - Adriatic
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

SONČNI OSTRIŽ / SONNENBARSCH / PUMPKINSEED

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	Sjadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – julij / Mai - Juli / May - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	600 – 5000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	10 - 15 cm, max. 40 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	tujerodna / allochthon / Alien
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

SREBRNI KORESELJ, BABUŠKA / GIEBEL / PRUSSIAN CARP

Carassius gibelio (Bloch, 1782)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donabecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	junij – julij / Juni - Juli / June - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	160 000 - 380 000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2
Velikost	Größe	Size:	15 - 35 cm, max. 45 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	tujerodna / allochthon / Alien
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

SULEC / HUCHEN / DANUBE SALMON

Hucho hucho (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – april / März - April / March - April
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	1000/ na kg telesne teže / pro kg Körpergewicht / per kg body weight
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	5 samci / Männchen / Male 3 samice / Weibchen / Female
Velikost	Größe	Size:	60 - 120 cm, max. 180 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous
(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)			

ŠARENKA / REGENBOGENFORELLE / RAINBOW TROUT

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	februar – april / Februar - April / February - April
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	1600 - 2000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3
Velikost	Größe	Size:	25 - 45 cm, max. 70 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	tujerodna / allochthon / Alien
Selitev	Migration	Migration mode:	-

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)

ŠČUKA / HECHT / PIKE

Esox lucius (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	februar – april / Februar - April / February - April
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	100.000 – 200.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 samice / Weibchen / Female 2 samci / Männchen / Male
Velikost	Größe	Size:	30 - 100 cm, max. 150 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	V - ranljiv / verletzlich / Vulnerable
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna - donavsko, naseljena - jadransko/ autochthon im Donaubecken – angesiedelt im Adriabecken / Native - Danube, translocated - Adriatic
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

UPIRAVEC / STREBER / STREBER

Zingel streber (Siebold, 1863)




Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	marec – maj / März - Mai / March - May
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	3000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3
Velikost	Größe	Size:	12- 18 cm, max. 22 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	E – ogrožen / gefährdet / Endangered
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)

ZELENIKA / LAUBE / COMMONBLEAK

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	april – junij / April - Juni / April - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	1500 - 6000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 – 3
Velikost	Größe	Size:	12 - 15 cm, max. 25 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Marijan Gaber)



ZLATI KORESELJ, ZLATA RIBICA / GOLDFISCH / GOLDFISH

Carassius auratus (Linnaeus, 1758)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	jadransko, donavsko / Donaubecken, Adriabecken / Adriatic, Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	junij – julij / Juni - Juli / June - July
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	34.000 – 300.000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	3 - 4
Velikost	Größe	Size:	20 - 25 cm, max. 45 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	-
Status vrste	Herkunft	Species status:	tujerodna / allochthon / Alien
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)

ZVEZDOGLED / STEINGRESSLING / STONE GUDGEON

Romanogobio uranoscopus (Agassiz, 1828)



Povodje Slovenija	Einzugsgebiet in Slowenien	River basin in Slovenia:	donavsko / Donaubecken / Danube
Čas drsti	Laichzeit	Spawning season:	maj – junij / Mai - Juni / May - June
Število iker	Anzahl der Eier	Number of eggs:	800 - 3000
Spolna zrelost v letih	Geschlechtsreife in Jahren	Sexual maturity – year:	2 - 3
Velikost	Größe	Size:	10 - 12 cm, max. 15 cm
Rdeči seznam	Rote Liste gefährdeter Arten RS	Red list of Slovenia:	V - ranljiv / verletzlich / Vulnerable
Status vrste	Herkunft	Species status:	domorodna / autochthon / Native
Selitev	Migration	Migration mode:	kratke selitve / kurze Migrationen / Potamodromous

(besedilo: dr. Metka Povž, avtor fotografije: Peter Valič)